

Vinhedo Casablanca

Altitude

De 280 a 390 metros acima do nível do mar.

Temperatura

Grande influência do Oceano Pacífico, principalmente durante a tarde, com temperatura média variando entre mínima de 2° C e máxima de 15° C no inverno. No verão a temperatura média varia entre mínima de 11° C e máxima de 25° C.

Solo

Solo de origem granítica com três diferentes texturas:

Matéria orgânica nos primeiros 15 cm · Médio-argiloso até os 80 cm de profundidade · Franco-arenoso. Franco-argiloso · Material de decomposição granítica a partir de 80 cm de profundidade. PH levemente ácido entre 6,0 e 7,0.

Videiras

A densidade varia de 2.667 a 4.167 plantas por hectare.

Pluviosidade

A precipitação média anual é de 520 mm entre os meses de Maio e Setembro.

Localização

A propriedade situa-se no Vale de Casablanca, 80 km a oeste de Santiago e a 30 km do Oceano Pacífico. A proximidade com o mar proporciona influência marítima à região.

Informações Gerais

226 hectares do vinhedo são irrigados através de gotejamento de água extraída de poços subterrâneos com 40 a 70 metros de profundidade.

Espera-se a colheita, em período de produção plena, de 10 toneladas por hectare para a linha Reserva e entre 5 e 7 toneladas por hectare para a linha Gran Reserva.

